

Pflanzenbau Aktuell Nr. 17/2020 – 30.04.2020 Herbizideinsatz in Kartoffeln

Durch die Niederschläge der nächsten Tage werden die Dämme angefeuchtet und Unkräuter und -gräser erhalten optimale Auflaufbedingungen. Aber auch die Voraussetzungen für bestmögliche Wirkungsgrade der Bodenherbizide sind gegeben. Bereits **aufgelaufene Unkräuter** werden durch die Zugabe von **0,3-0,4 + 0,75-1,0 l/ha Quickdown + Toil** sicher erfasst.

Übersicht: Mögliche Produktkombinationen zum Voraufbau-Herbizideinsatz in Kartoffeln

Herbizid-kombinationen	Aufwandmenge (l bzw. kg/ha)	Wirkung auf												
		Ackerfuchschwanz	Flughäfer	Hühnerhirse	Amarant	Ausfallraps/ Ackersenf	Bingelkraut	Franzosenkraut	Gänsefuß, Melde	Kamille	Klettenlabkraut	Schwarzer Nachtschatten	Windenknöterich	Knöterich- Arten
Metribuzin-frei														
Bandur + Proman	2,5 + 2,0	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx(x)	xx(x)	x(x)	xx	xx(x)
Boxer + Proman	3,0 + 2,0	x(x)	x(x)	xx	xx	xx(x)	x(x)	xxx	xx(x)	xx	xx(x)	xx(x)	xx	xx
Centium 36 CS + Proman	0,25 + 2,0-2,5	(x)	-	xx(x)	xx(x)	xx	x	xxx	xxx	xx(x)	xx(x)	xx	xx	xxx
Novitron DamTec + Proman	2,0 + 2,0	x(x)	x(x)	xxx	xxx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	xxx	xx(x)	x(x)	xx	xxx
Metribuzin-haltig														
Arcade¹⁾	4,0-5,0	xx(x)	x	xx	x(x)	xxx	x	xxx	xx(x)	xx(x)	xx(x)	xx	xx	xx
Artist + Centium 36 CS	2,0 + 0,25	xxx	-	xxx	x(x)	xxx	xx(x)	xx(x)	xxx	xx(x)	xxx	xx	xx	xx(x)
Bandur + Artist	2,0 + 2,0	xxx	x(x)	xx(x)	xx	xxx	xx	xx(x)	xxx	xxx	xx(x)	x(x)	xx	xx
Bandur + Sencor Liquid	3,0 + 0,4-0,6	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx(x)	x(x)	xx	xxx
Boxer + Sencor Liquid	4,0 + 0,4	xx	x(x)	xx	x(x)	xx(x)	x(x)	xxx	xx(x)	xx(x)	xx(x)	xx(x)	xx	xx
Novitron DamTec + Sencor Liquid	2,0 + 0,4	xx(x)	x(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx(x)	x(x)	x(x)	xx
Proman + Metric	2,0 + 2,0	xx	-	xxx	xx(x)	xx(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	x(x)	xx	xx(x)

¹⁾ Drainauflage NG405 beachten!

Hinweis: 0,2-0,4 l/ha Herbosol unterstützen die Haftung des Bodenherbizids an den Bodenteilchen. Eine Verlagerung in tiefere Bodenschichten auf lockeren Dämmen oder durch starke Niederschläge wird somit verringert.

Die **Bekämpfung von Ungräsern** erfolgt im 3- bis 4-Blatt-Stadium der Gräser (NA Kultur). Es empfehlen sich beispielsweise **1,0 l/ha Fusilade Max** (Quecke 2,0 l/ha), **1,5 + 1,5 l/ha Focus Aktiv Pack** (Quecke 2,5 + 2,5 l/ha), **0,75 + 1,0 l/ha Select 240 EC + Radiamix** (Quecke 1,0 + 1,0 l/ha) oder **1,0 l/ha Zetrola**.